

اخبار تصویری



اجرای طرح ضربت بازرسی و کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان ملکشاهی



اقامه نماز ظهر و عصر با حضور امام جمعه شهرستان دهلران در ماه مبارک رمضان در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان



امضا تفاهتنامه همکاری بین دانشگاه و فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی استان در حوزه بهداشت و درمان



حضور دکتر ساغری رئیس مجمع شورای مشورتی توسعه استان در جلسه طرح تحول نظام سلامت دانشگاه



حضور کارکنان دانشگاه در راهپیمایی روز جهانی قدس



جلسه دفاعیه اولین پایان نامه دکترای تخصصی در دانشگاه با حضور پرفسور منتظری و پرفسور دل پیشه



کمیته قلیان ها را گلدان کنیم با حضور کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ایلام با جمعیت هلال احمر



دیدار دکتر دل پیشه با دکتر میرزایی نماینده مردم استان در مجلس



دیدار دکتر دل پیشه و شادمهر کاظم زاده نماینده مردم استان در مجلس

کودک، دچار مشکل در مکیدن سینه مادر یا شیشه شیر

دکتر طبیبی با بیان اینکه کودکان مبتلا به شکاف بزرگ میگویند سینه مادر یا شیشه شیر دچار مشکلات عمده ای هستند، عنوان کرد: این مشکل با استفاده از بستنک های بلند که به داخل دهان نوزاد فرو رفته تا حدودی مرتفع می شود. وی افزود که راه های دیگر استفاده از قطره چششی با سرنگ های بزرگ یا لوله های لاستیکی متصل به آن است که در داخل دهان بیمار گذاشته شده و مقدار کمی از محلول تزریق می شود.

استادیار عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی قزوین، هشدار داد به علت اینکه اینگونه کودکان به مقدار زیادی هوا می بلعند، در حالت دراز کشیده نباید به آنان غذا داد و گاهی از نوع زود نین لام است. ایشان اضافه کرد تا زمان انجام جراحی بستن شکاف کام می توان از سسود کننده های کامس متحرک برای جدا کردن فرجه دهان و بینی استفاده کرد.

توزم آموزش والدین، قبل از تولد نوزاد
این متخصص ارتودنسی با بیان اینکه مداخلات درمانی دیگری نیز از نظر جنبه های خانوادگی، روانی و اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی این معماران مورد نیاز است، گفت: به محض تشخیص بیماری نوزاد (حتی قبل از تولد) باید به آموزش والدین پرداخت.

دکتر طبیبی با گفتن اینکه والدین باید از ملاحظات لازم مربوط به تغذیه و نگهداری از این بیماران، فرآیند طولانی مدت درمان کودکان تا سن بزرگسالی، انتخاب های درمانی و حمایت های عاطفی و روانی در تربیت فرزندان آگاه شوند، اظهار کرد: احتمال نیاز به مداخلات پیشگیرانه و درمانی در زمینه های روانشناختی و هیپوتولاجی در تأثیرات منفی اجتماعی در مبتلایان به این گونه نواقص وجود دارد که حتماً باید به این مسائل نیز توجه کرد.

بیوست، باعث تنش های فیزیکی، هیجانی و رفتاری در کودک می شود


همواره بیوست به عنوان مشکلی نه چندین غیر شایع در کودکان مطرح می باشد. این بیماری به ندرت با عوارضی تهدید کننده حیات همراه است، اما در اغلب مواقع، باعث تنش های فیزیکی و هیجانی شده، کودک و خانواده وی را باسائنگرانی های مضاعف مواجه می سازد. در مواردی ممکن است بیوست، مسبب مشکلات رفتاری در محیط مدرسه شده و در نهایت کیفیت زندگی کودک را مختل سازد.

به گفته دکتر رینا باقریان، پزشک فوق تخصص گوارش کودکان، شاخص اصلی بیوست در کودکان، دفع دردناک و غیر مکرر مدفوع به همراه بی اختیاری مدفوع است که اغلب با درد شکم در کودک، توام می باشد. همچنین، الگوی طبیعی دفع مدفوع در کودکان، تابع شرایط سنی بوده و با افزایش سن کودک تغییر می یابد.

پزشک مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با اشاره به اینکه شیرخوار سالم ممکن است در ماه های اول زندگی بیش از چهار نوبت دفع مدفوع داشته باشد، گفت: متعاقباً کاهش تدریجی در دفعات دفع ایجاد شده، به طوری که تا سن چهار سالگی، این توالبی به یک و یا دو روز خواهد رسید.

بنا به اظهار این پزشک فوق تخصص گوارش کودکان، شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، در مقایسه با شیرخوارانی که تغذیه با شیر خشک دارند، معمولاً دفع مدفوع مکرر و نرم تر را تجربه می کنند. وی ادامه داد که پس از پنج سالگی، بیشتر کودکان سالم به طور طبیعی دفع روزانه با یک روز در میان مدفوع نرم را خواهند داشت.

مبتلایان به اسهال، مصرف میوه را به موز و سیب محدود کنند



به گزارش پایگاه خبری وب داد پزشکی متخصص کودکان دانشگاه گفت: مصرف میوه در دوران اسهال باید به موز و سیب محدود شود.

دکتر شمیم شمکری افزود: مصرف سبزیجات و میوه ها و مایعات شیرین برای مبتلایان به اسهال ممنوع است. وی تأکید کرد: مصرف مایعاتی نظیر دوغ و آب و سوپ بدون سبزیجات و جوی برنج یا جو به این افراد توصیه می شود.

وی ضمن تأکید بر ضرورت ادامه تغذیه با شیر مادر در کودکان مبتلا به اسهال، گفت: بر خلاف تصور عموم تغذیه با شیر مادر در دوران ابتلا به اسهال مفید است و باید ادامه یابد.

دکتر شمکری افزود: با وجود علائمی در کودک نظیر نداشتن اشتها، کاهش وزن و بی قراری زیاد و نداشتن ادرار و استفراغ های مکرر باید هر چه سریع تر به بیمارستان یا پزشک متخصص مراجعه کنید. وی تصریح کرد: در اسهال نوع باکتریال که با خون، دل پیچه و تب همراه است، مصرف آنتی بیوتیک ضروری است که باید توسط پزشک تجویز شود.